レジメン名	ベンダムスチン(120)(外来)
がん種	悪性リンパ腫

一般名	投与量	単位
ベンダムスチン	120	mg/㎡

21日で1コース

day	1	2	3	・・・	21	22	23	24	・・・	42

1コース　2コース

リツキシマブ併用時は
day1にリツキシマブ

治療内容(day2,3)

メイン	経過時間	側管
ソリタT3(200ml) 7%メイロン　1A 30分	0	ラモセトロン　1A デキサート(3.3mg/ml) 3A 生食(50ml) 全開滴下
生食(250ml) 1時間	:30	ⓘ 1時間 (遮光) トレアキシン 生食(250ml)
ソリタT3(200ml) 7%メイロン　1A 30分	1	
	:30	
	2	
	:30	
	3	

トレアキシンは調製から
3時間以内に投与を終える。



◎トレアキシン調製後の輸液はpH3～4となり、血管刺激症状を起こす可能性がある。
【対策】
・なるべく太い血管を選び穿刺する。
・穿刺部位より上流側を温めて血管を拡張させる。
・別の輸液の側管投与とすることで、血管内の薬物濃度を薄める。

◎トレアキシンは溶解後徐々に加水分解する。
（生理食塩水のみとの配合変化の情報がある）
【対策】
・調製から3時間以内に投与を完了する。
・メイロン入りソリタT3(pH7.5程度)は腫瘍崩壊症候群の予防上必須である。