レジメン名	トラスツズマブ＋パクリタキセル(80)
がん種	乳癌

一般名		投与量	単位
トラスツズマブ	(初回量)	4	mg/kg
	(維持量)	2	mg/kg
パクリタキセル		80	mg/㎡

ハーセプチンは毎週投与

1 2 3 4 5 6

6週投与、2週休薬
8週で1クール

day 1 ・・・ 8 ・・・ 15 ・・・ 22 ・・・ 29 ・・・ 36 ・・・ 43 ・・・ 50 ・・・

1クール

治療内容

メイン　側管

ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。
治療薬の投与中は中止可。
残破棄可。

ソリタT1(500ml)
ハーセプチン投与中は止めておく

ルート確保

経過時間

0 :30 1 :30 2 :30 3 :30 4 :30 5 :30 6 :30 7

(30分) ⓝ
90分

全開滴下

30分あける

ⓥ
1時間

初回治療時の
インフュージョンリアクションが
軽度であれば、次回より
投与時間を30分まで短縮可

ハーセプチン
生食(250ml)

デキサート開始時
レスタミンコーワ
5錠内服

デキサート(3.3mg/1ml) 3A
ガスター(20mg/2ml) 1A
生食(50ml)

パクリタキセル
生食(250ml)

パクリタキセルには、
0.22μm以下の
メンブランフィルターを使用

最後は、針先が
抗癌剤を含まない輸液に
満たされた後、抜針する。

パクリタキセルには、
ビールで
コップ1杯程度の
アルコールが含まれる